


فصل اول

مبانی نظریه گروه‌ها و نظریه بازنمایی

از تقارن‌های متناهی تا بازنمایی‌های کوانتومی



نویسنده و تدوین‌گر نسخه آموزشی

دکتر اباصلت رستمی

گروه فیزیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ترجمه و بازنویسی آموزشی بر اساس فصل نخست کتاب

Continuous Groups for Physicists

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی نظریه گروه‌ها و نظریه بازنمایی

بخش‌های ۱.۱ تا ۵.۱

مبانی و ساختار گروه‌ها

۳	تعریف گروه	1.1
۴	چند نمونه مهم	1.2
۵	عملیات درون یک گروه	1.3
۸	روابط میان گروه‌ها و روش‌های ترکیب آن‌ها	1.4
۹	تحقق‌های یک گروه و عمل گروهی	1.5

بخش‌های ۶.۱ تا ۱۲.۱

ساختار خطی و بازنمایی‌ها

۱۱	بازنمایی‌های گروه	1.6
۱۲	بازنمایی‌های معادل	1.7
۱۲	بازنمایی‌های یکانی و متعامد	1.8
۱۳	ماتریس‌های یک بازنمایی	1.9
۱۴	عملیات روی بازنمایی‌ها	1.10
۱۵	کاراکتر بازنمایی	1.11
۱۵	زیرفضاهای ناورد؛ تحویل‌پذیری و تحویل‌ناپذیری	1.12

بخش‌های ۱۳.۱ تا ۱۵.۱

لم شور، تجزیه و جبر گروه

۱۷	لم شور: اثبات و کاربردهای بنیادی	1.13
۲۳	جبر گروه	1.14
۲۴	بازنمایی‌های گروه و مدول‌های جبر گروه	1.15

مسائل، واژه‌نامه و منابع

ضمیمه‌های آموزشی

۲۶	مسائل پایان فصل کتاب و حل تشریحی آن‌ها	—
۲۸	چالش‌های تکمیلی محاسباتی	—
۳۰	واژه‌نامه بسیار کوتاه	—
۳۰	منابع و یادداشت درباره متن	—

پیشگفتار فصل اول

هدف این فصل، ساختن زبانی دقیق برای بیان «تقارن» است. گروه‌ها ابتدا به صورت مجموعه‌هایی مجهز به یک قانون ترکیب معرفی می‌شوند؛ اما آنچه برای یک فیزیک‌دان حیاتی است، تبدیل عناصر مجرد به عملگرها و ماتریس‌هایی است که بر حالت‌ها و مشاهده‌پذیرها اثر می‌گذارند. در ادامه خواهیم دید چگونه رد یک ماتریس، بی‌آنکه لازم باشد همه درایه‌های آن را بشناسیم، اطلاعاتی عمیق درباره بازنمایی به ما می‌دهد.

پیش‌نیازها: نظریه مقدماتی مجموعه‌ها، فضاها، برداری حقیقی و مختلط، تبدیلات خطی، ضرب داخلی، رد و دترمینان ماتریس. هر جا به نکته‌ای فنی‌تر نیاز باشد، آن را در مثال‌ها توضیح می‌دهیم.

۱.۱ تعریف گروه

یک گروه مجموعه‌ای ناتمامی مانند $G = \{a, b, c, \dots, e, \dots\}$ به همراه یک عمل دوتایی مشخص است؛ این عمل را، حتی اگر ضرب عددی نباشد، به اختصار با کنار هم نوشتن دو عنصر نمایش می‌دهیم. چهار اصل لازم‌اند:

(i) بسته بودن: اگر $a, b \in G$ ، آنگاه ab دقیقاً یک عضو از G است.

(ii) شرکت پذیری: برای هر سه عضو، $a(bc) = (ab)c$. این اصل با جابه‌جایی $ab = ba$ فرق دارد.

(iii) عضو همانی: عضوی یکتا به نام e وجود دارد که $ae = ea = a$ برای تمام a ها.

(iv) عضو وارون: هر a عضو وارون یکتای a^{-1} دارد و $a^{-1}a = aa^{-1} = e$.

به این اصول اصول موضوعه گروه می‌گوییم. گاهی می‌توان فرض‌های ظاهراً ضعیف‌تری مانند وجود همانی چپ و وارون چپ را بیان کرد و سپس شرط‌های دوطرفه را نتیجه گرفت؛ اثبات آن در بخش مسائل انتهایی آمده است.

اگر تعداد اعضای گروه محدود باشد، G را متناهی می‌گوییم و $|G|$ را مرتبه گروه می‌نامیم. گروه‌های نامتناهی ممکن است گسسته، مانند $(\mathbb{Z}, +)$ ، یا پیوسته و دارای ساختار منیفلد باشند، مانند گروه دوران‌های صفحه.

مثال حل‌شده: گروهی که «شبه جمع» است ولی جابه‌جایی ندارد

مجموعه تبدیل‌های $T_{a,b}(x) = ax + b$ با $a \neq 0$ را در نظر بگیرید. باید بررسی کنیم تحت ترکیب توابع یک گروه است یا نه. گام ۱. ترکیب را حساب می‌کنیم:

$$T_{a,b} \circ T_{c,d}(x) = a(cx + d) + b = acx + (ad + b).$$

پس $T_{a,b}T_{c,d} = T_{ac, ad+b}$ و عمل بسته است.

گام ۲. چون ترکیب توابع شرکت‌پذیر است، شرط دوم برقرار است. عضو همانی $T_{1,0}$ است.

گام ۳. از معادله $y = ax + b$ به دست می‌آوریم $x = (y - b)/a$ ، بنابراین

$$T_{a,b}^{-1} = T_{a^{-1}, -b/a}.$$

گام ۴. جابه‌جایی را می‌آزماییم. $T_{\frac{1}{2}, 1}(x) = 2x + 2$ ولی $T_{\frac{1}{2}, 1}(x) = 2x + 1$ پس گروه ناجابجایی است.

یادداشت تاریخی: از معادلات جبری تا تقارن

مفهوم گروه از یک مسیر یگانه پدید نیامد: حل معادلات جبری، نظریه اعداد و هندسه قرن نوزدهم هر سه در شکل‌گیری آن نقش داشتند. ایده مهم این بود که به جای تمرکز بر شیء، تبدیلاتی را مطالعه کنیم که روابط آن شیء را حفظ می‌کنند. (منبع تاریخی: MacTutor, The development of (group theory)

چند نمونه مهم ۲.۱

گروه متقارن S_n . جایگشت‌های n شیء، گروهی با مرتبه $n!$ تشکیل می‌دهند. اگر $p \in S_n$ می‌توان نوشت

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ p(1) & p(2) & \cdots & p(n) \end{pmatrix}, \quad (qp)(j) = q(p(j)).$$

در این قرارداد، ابتدا عملگر سمت راست اجرا می‌شود. همچنین هر جایگشت به حاصل ضرب دوره‌های جدا از هم تجزیه می‌شود؛ همانی $e = (1)(2) \cdots (n)$ و وارون با وارونه‌کردن جهت هر دور ساخته می‌شود.

نمونه‌های آبله دیگر: اعداد صحیح تحت جمع، اعداد حقیقی مثبت تحت ضرب، و بردارهای یک فضای خطی تحت جمع. عضو خنثی در این سه نمونه، به ترتیب ۰، ۱ و بردار صفر است.

گروه‌های هندسی. $SO(2)$ و $SO(3)$ دوران‌های جهت‌نگهدار صفحه و فضای سه‌بعدی‌اند؛ $O(2)$ و $O(3)$ بازتاب‌ها را نیز دربر می‌گیرند و دو مؤلفه پیوسته دارند. تعمیم‌ها شامل $SO(n)$, $O(n)$, $SU(n)$, $U(n)$ ، گروه‌های متعامد مختلط و گروه‌های فضا-زمان، مانند اقلیدسی، گالیله‌ای، لورنتسی و پوانکاره‌اند. تقارن‌های شکل‌های منتظم، نمونه‌های گروه نقطه‌ای را فراهم می‌کنند.

گروه آبله است اگر $ab = ba$ برای همه اعضا. S_2 و $SO(2)$ آبله‌اند، اما S_n برای $n \geq 3$ و $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$ ناجابجایی‌اند.

از یکتایی وارون، قاعده حذف نتیجه می‌شود:

$$ab = ac \iff b = c, \quad ba = ca \iff b = c.$$

برای یک گروه متناهی می‌توان جدول ضرب یا جدول کیلی ساخت. چون قاعده حذف برقرار است، هر سطر و هر ستون دقیقاً یک بار تمام عناصر گروه را دربر دارد.

مثال حل‌شده: ضرب دورها در S_3 بدون حدس‌زدن

بگذارید $p = (123)$ و $q = (12)$. می‌خواهیم qp و pq را بیابیم. طبق قرارداد، در qp اول p عمل می‌کند.

x	۱	۲	۳
$p(x)$	۲	۳	۱
$q(p(x))$	۱	۳	۲

پس $qp = (23)$ در جهت دیگر:

x	۱	۲	۳
$q(x)$	۲	۱	۳
$p(q(x))$	۳	۲	۱

بنابراین $qp = (23) \neq pq = (13)$. حتی با سه شیء، ترتیب اجرای عملیات اهمیت دارد.

مثال حل‌شده: جدول ضرب کوچک اما پُر اطلاعات

گروه $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ با جمع پیمانه ۴ را در نظر بگیرید. مثلاً $3 + 2 \equiv 1 \pmod{4}$ ، پس:

$+_4$	۰	۱	۲	۳
۰	۰	۱	۲	۳
۱	۱	۲	۳	۰
۲	۲	۳	۰	۱
۳	۳	۰	۱	۲

همانی صفر است؛ وارون‌های ۱، ۲، ۳ به ترتیب ۳، ۲، ۱ هستند. هر سطر و ستون یک جایگشت از چهار عضو است. نکته فیزیکی: این گروه می‌تواند چهار انتقال پیاپی روی حلقه‌ای با چهار جایگاه را توصیف کند.

پیوند با فیزیک: چرا $SO(3)$ ناجابجایی است؟

دو دورانِ نوددرجه‌ای حول محورها x و y را در نظر بگیرید. اگر $\mathbf{e}_z = (0, 0, 1)^T$ ، آنگاه

$$R_x\left(\frac{\pi}{4}\right)R_y\left(\frac{\pi}{4}\right)\mathbf{e}_z = (1, 0, 0)^T, \quad R_y\left(\frac{\pi}{4}\right)R_x\left(\frac{\pi}{4}\right)\mathbf{e}_z = (0, -1, 0)^T.$$

پس به طور کلی $R_x R_y \neq R_y R_x$. این تفاوت اساس رابطه‌های جابه‌جاییِ تکانه زاویه‌ای در مکانیک کوانتومی است.

عملیات درون یک گروه

۳.۱

۱.۳.۱ هم‌نهشتی، کلاس‌های مزدوج و زیرگروه‌ها

اگر $a, b \in G$ ، عنصر $a' = bab^{-1}$ را مزدوج a به وسیله b می‌نامیم. کلاس مزدوج عنصر a مجموعه

$$C(a) = \{bab^{-1} : b \in G\}$$

است. مزدوج بودن یک رابطه هم‌ارزی است؛ بنابراین کلاس‌ها یا دقیقاً یکسان‌اند یا اشتراک ندارند و اجتماع آن‌ها کل گروه است. همواره $C(e) = \{e\}$. در S_n دو جایگشت زمانی و تنها زمانی مزدوج‌اند که ساختار دوری یکسان داشته باشند. در $SO(3)$ دوران‌های دارای یک زاویه یکسان (با محورهای ممکن مختلف)، در یک کلاس جای می‌گیرند.

زیرمجموعه ناتهی $H \subseteq G$ را زیرگروه می‌گوییم اگر با همان عمل گروهی، خود یک گروه باشد. آزمون کوتاه زیرگروه چنین است:

$$H \leq G \iff h_1^{-1}h_2 \in H \quad (h_1, h_2 \in H),$$

به شرط ناتهی بودن H . نمونه‌ها: اعداد زوج در $\mathbb{Z}$ ، جایگشت‌های زوج A_n در S_n ، جایگشت‌های ثابت‌گذار n و دوران‌ها حول یک محور ثابت.

هر عضو a از گروه متناهی، یک زیرگروه دوری تولید می‌کند:

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{q-1}\}, \quad q = \text{ord}(a), \quad a^q = e.$$

عدد q مرتبه عضو است؛ در بخش بعد نشان می‌دهیم $q \mid |G|$. افزون‌براین، gHg^{-1} همواره یک زیرگروه مزدوج با H است.

مثال حل‌شده: کلاس‌های مزدوج S_3 را از صفر بسازیم

اعضای S_3 عبارت‌اند از e ، سه جابه‌جایی (12) ، (13) ، (23) و دو دور سه‌تایی (123) ، (132) . گام ۱. برای هر $g \in S_3$ داریم $g(12)g^{-1} = (g(1)g(2))$ ، پس هر ترانهاده به ترانهاده دیگری مزدوج می‌شود.

گام ۲. مشابه آن، $g(123)g^{-1} = (g(1)g(2)g(3))$ ، یک دور سه‌تایی باقی می‌ماند. نتیجه:

$$C_1 = \{e\}, \quad C_2 = \{(12), (13), (23)\}, \quad C_3 = \{(123), (132)\}.$$

اندازه‌ها $1 + 3 + 2 = 6$ می‌شوند؛ کمی جلوتر خواهیم دید چرا همین عدد ۳، تعداد بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر نامعادل را نیز مشخص می‌کند.

۲.۳.۱ هم‌دسته‌ها، قضیه لاگرانژ و گروه خارج‌قسمتی

برای زیرگروه H ، مجموعه‌های $aH = \{ah : h \in H\}$ و $Ha = \{ha : h \in H\}$ را دو گونه هم‌دسته می‌نامند. هر دو خانواده، گروه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم می‌کنند. هر هم‌دسته به اندازه H عضو دارد؛ در نتیجه

$$|G| = [G : H] |H|, \quad |H| \mid |G|.$$

این همان قضیه لاگرانژ است. اگر $gHg^{-1} = H$ برای هر $g \in G$ ، زیرگروه را نرمال می‌نامیم و می‌نویسیم $H \trianglelefteq G$. در این حالت $aH = Ha$ ، و هم‌دسته‌ها با عمل $(aH)(bH) = abH$ یک گروه خارج‌قسمتی G/H می‌سازند که مرتبه‌اش $|G|/|H|$ است.

یادداشت آموزشی و ویرایشی: تفاوت یک نام‌گذاری در متن مبدأ

در متن انگلیسی این فصل، برچسب‌های «چپ» و «راست» برای aH و Ha برخلاف قرارداد رایج امروزی آمده‌اند. در این جزوه از قرارداد متعارف استفاده می‌کنیم: aH هم‌دسته چپ و Ha هم‌دسته راست است. همه فرمول‌های ریاضی مربوط، مستقل از این نام‌گذاری‌اند.

مثال حل‌شده: یک خارج‌قسمتی واقعی: S_3/A_3

گروه $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ سه عضو دارد. هر جایگشت زوج است یا فرد و حاصل ضرب جایگشت‌های هم‌پاریتی زوج است؛ پس $A_3 \trianglelefteq S_3$. گام ۱. از $|S_3|/|A_3| = 2$ فقط دو هم‌دسته داریم:

$$A_3, (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

گام ۲. اگر $X = (12)A_3$ ، آنگاه $X^2 = A_3$. نتیجه. جدول ضرب خارج‌قسمتی با $\mathbb{Z}_2$ یکسان است و $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$. پس «زوج یا فرد بودن» یک گروه دو عضوی می‌سازد.

۳.۳.۱ مرکز، گروه جابه‌جاساز و گروه‌های ساده

مرکز گروه عبارت است از

$$Z(G) = \{a \in G : ab = ba \text{ برای هر } b \in G\}.$$

جابه‌جاساز گروهی دو عضو را با $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ تعریف می‌کنیم. این عضو دقیقاً وقتی همانی است که a و b جابه‌جا شوند؛ همچنین

$$[a, b]^{-1} = [b, a], \quad c[a, b]c^{-1} = [cac^{-1}, cbc^{-1}].$$

زیرگروه مشتق یا زیرگروه جابه‌جاساز، $G' = [G, G]$ ، از تمام حاصل ضرب‌های متناهی این جابه‌جاسازها ساخته می‌شود و نرمال است. خارج‌قسمتی G/G' آبلی است؛ در واقع اگر G/H آبلی باشد، لزوماً $G' \subseteq H$. برای S_n با $n \geq 2$ داریم $S'_n = A_n$.

گروه ساده زیرگروه نرمال سره نابدیهی ندارد؛ گروه نیمه‌ساده در تعریف به‌کاررفته در فصل، زیرگروه نرمال آبلی نابدیهی ندارد. پس ساده بودن، نیمه‌ساده بودن را نتیجه می‌دهد. برای S_4 ، افزون بر A_4 ، زیرگروه نرمال چهارعضوی V_4 نیز وجود دارد و $S_4/V_4 \cong S_3$. گروه $SO(3)$ از منظر زیرگروه‌های نرمال مجرد، ساده است.

مثال حل‌شده: چرا $S'_3 = A_3$ ؟

گام ۱. نگاشت علامت $\text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\}$ همریختی است. تصویر آبدلی است، پس هر جابه‌جاساز علامت $+1$ دارد و $S'_3 \subseteq A_3$.

گام ۲. برای $a = (12)$ و $b = (23)$ ، از وارون‌پذیری ترانهادها استفاده می‌کنیم:

$$[a, b] = (12)(23)(12)(23) = (132),$$

که مولد A_3 است.

نتیجه. چون S'_3 شامل مولد A_3 است، $A_3 \subseteq S'_3$ ؛ پس برابری برقرار است.

۴.۳.۱ خودریختی‌ها

خودریختی نگاشت یک‌به‌یک و پوشای $\tau : G \rightarrow G$ است که $\tau(ab) = \tau(a)\tau(b)$. هر خودریختی، همانی و وارون‌ها را حفظ می‌کند. برای $g \in G$ ، نگاشت $\tau_g(a) = gag^{-1}$ یک خودریختی درونی است. خودریختی‌هایی که از این صورت نیستند، بیرونی نام دارند. در گروه آبدلی، تمام خودریختی‌های درونی، همانی‌اند.

مثال حل‌شده: خودریختی‌های $\mathbb{Z}_5$

هر همریختی گروه جمعی $\mathbb{Z}_5$ با تصویر ۱ تعیین می‌شود: اگر $\tau(1) = k$ ، آنگاه $\tau(m) = km \pmod{5}$. برای خودریختی باید $k \neq 0$ باشد، چون در غیر این صورت تمام عناصر به صفر می‌روند. پس چهار خودریختی داریم، متناظر با $k = 1, 2, 3, 4$. ترکیب خودریختی‌ها به ضرب پیمانه ۵ تبدیل می‌شود؛ بنابراین

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_5) \cong \mathbb{Z}_5^\times \cong \mathbb{Z}_4.$$

۴.۱ روابط میان گروه‌ها و روش‌های ترکیب آن‌ها

همریختی. نگاشت $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ همریختی است اگر $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. خودبه‌خود $\varphi(e_1) = e_2$ ، $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ و تصویر $\text{im } \varphi$ زیرگروهی از G_2 است. هسته، $\ker \varphi = \{a : \varphi(a) = e_2\}$ ، زیرگروهی نرمال است.

یکریختی. همریختی دوسویی را یکریختی می‌گوییم و $G_1 \cong G_2$ می‌نویسیم. قضیه بنیادی نخست یکریختی می‌گوید

$$G_1 / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi.$$

ضرب مستقیم. اعضای $G_1 \times G_2$ زوج‌های مرتب‌اند و

$$(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1b_1, a_2b_2), \quad (e_1, e_2), \quad (a_1, a_2)^{-1} = (a_1^{-1}, a_2^{-1}).$$

مرتبه ضرب مستقیم، حاصل ضرب مرتبه‌ها است؛ هر عامل به‌طور طبیعی زیرگروهی نرمال از ضرب مستقیم است.

ضرب نیمه‌مستقیم. اگر برای هر $a \in G_1$ خودریختی $\tau_a \in \text{Aut}(G_2)$ داشته باشیم، به گونه‌ای که $\tau_a \tau_b = \tau_{ab}$ و $\tau_{a^{-1}} = \tau_a^{-1}$ ، ضرب پیچ‌خورده زیر را تعریف می‌کنیم:

$$(a, x)(b, y) = (ab, x \tau_a(y)).$$

در این ساختار، عامل دوم نرمال است و خارج‌قسمتی بر آن، با عامل اول یکریخت است. این همان ضرب نیمه‌مستقیم $G_2 \rtimes G_1$ در قرارداد رایج است؛ در متن مبدأ ترتیب نوشتن دو عامل متفاوت انتخاب شده است.

مثال حل‌شده: از ضرب نیمه‌مستقیم تا تقارن یک مثلث

گروه دوران‌های مثلث منتظم $\mathbb{Z}_3 = \langle r \mid r^3 = e \rangle$ و بازتاب‌های حاصل از یک بازتاب منتخب، $\mathbb{Z}_2 = \langle s \mid s^2 = e \rangle$ را در نظر بگیرید. رابطه هندسی $srs^{-1} = r^{-1}$ است. هر تقارن به شکل $r^i s^j$ با $i = 0, 1, 2$ ، $j = 0, 1$ نوشته می‌شود. در نتیجه

$$(r^i s^j)(r^k s^\ell) = r^{i+(-1)^j k} s^{j+\ell},$$

با توان‌های پیمانه ۳ و ۲. پس گروه شش‌عضوی تقارن‌های مثلث

$$D_3 \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong S_3$$

است. تفاوت این گروه با $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ همان منفی‌شدن k هنگام حضور بازتاب است؛ اولی ناجابجایی و دومی آبدلی است.

پیوند با فیزیک: تقارن‌های فضا-زمان

در گروه اقلیدسی سه‌بعدی، دوران R بر بردار انتقال a اثر می‌کند:

$$(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb).$$

این یک ضرب نیمه‌مستقیم $\mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$ است، نه ضرب مستقیم؛ چون جابه‌جایی یک جسم پیش از دوران با جابه‌جایی همان جسم پس از دوران یکسان نیست.

۵.۱ تحقق‌های یک گروه و عمل گروهی

برای تحقق یک گروه روی مجموعه X ، به هر $g \in G$ یک نگاشت دوسویی $\phi_g : X \rightarrow X$ نسبت می‌دهیم به گونه‌ای که

$$\phi_e = \text{Id}_X, \quad \phi_{g_1} \circ \phi_{g_2} = \phi_{g_1 g_2}, \quad \phi_{g^{-1}} = (\phi_g)^{-1}.$$

به این ساختار، عمل گروهی نیز می‌گوییم. چند مفهوم طبیعی از آن پدید می‌آید:

- مدار یک نقطه: $\mathcal{O}(x) = \{\phi_g(x) : g \in G\}$
- پایدارساز (گروه همسانگردی): $H_x = \{g \in G : \phi_g(x) = x\}$

▪ نقاط ثابت یک عضو g : $X^g = \{x \in X : \phi_g(x) = x\}$.

رابطه $x \sim y$ به معنای $y = \phi_g(x)$ برای دست‌کم یک g ، رابطه‌ای هم‌ارزی است و مجموعه X را به مدارهای جدا از هم تقسیم می‌کند. پایدارساز هر نقطه زیرگروه است و برای گروه متناهی، $|\mathcal{O}(x)| = [G : H_x]$. در مکانیک هامیلتونی، گروه‌ها معمولاً به شکل تبدیلات کانونی فضای فاز ظاهر می‌شوند. در مکانیک کوانتومی، اصل برهم‌نهی، فضای حالت برداری (معمولاً هیلبرت) را مهم می‌کند؛ بنابراین تحقق‌های خطی گروه، یعنی بازنمایی‌ها، ابزار اصلی ما خواهند بود.

مثال حل‌شده: مثلث رنگی و قضیه مدار - پایدارساز

سه رأس مثلث را با ۱، ۲، ۳ بنامید. گروه S_3 روی مجموعه $X = \{1, 2, 3\}$ عمل می‌کند. مدار رأس ۱ کل X است، زیرا جایگشتی وجود دارد که آن را به هر رأس دلخواه ببرد. گام ۱. پایدارساز رأس ۱ دو عنصر دارد: $H_1 = \{e, (23)\}$. گام ۲. پس

$$|\mathcal{O}(1)| = \frac{|S_3|}{|H_1|} = \frac{6}{2} = 3,$$

دقیقاً به اندازه تعداد رأس‌ها.

گام ۳. اگر $y = g \cdot 1$ ، آنگاه h زمانی y را ثابت نگه می‌دارد که $g^{-1}hg$ رأس ۱ را ثابت نگه دارد؛ پس $H_y = gH_1g^{-1}$. این همان علت مزدوج‌بودن پایدارسازهای نقاط یک مدار است.

مثال حل‌شده: یک آزمایش شمارشی: چند رنگ‌آمیزی واقعاً متفاوت؟

رأس‌های یک مثلث منتظم را با دو رنگ سیاه و سفید رنگ بزنید؛ چرخاندن مثلث، رنگ‌آمیزی جدید محسوب نمی‌شود. گروه دوران C_3 سه عضو دارد. گام ۱. همانی هر $2^3 = 8$ رنگ‌آمیزی را ثابت می‌گذارد. گام ۲. هر دوران 120° یا 240° تنها زمانی رنگ‌آمیزی را تغییر نمی‌دهد که هر سه رأس یک‌رنگ باشند؛ پس هرکدام ۲ حالت ثابت دارند. گام ۳. با لم شمارش مدارها، که در مسائل انتهای فصل اثبات می‌شود:

$$\# \text{ مدارها} = \frac{8 + 2 + 2}{3} = 4.$$

چهار حالت را می‌توان با تعداد رأس‌های سیاه ۰، ۱، ۲، ۳ نمایش داد. جمله شوخی ریاضی: قبل از خرید هشت مدل مثلث رنگی، اول ببینید چهار تایی آن‌ها فقط چرخیده‌اند!

یادداشت تاریخی: لمی که ظاهراً نام صاحب اصلی‌اش را ندارد

فرمول شمارش مدارها معمولاً «لم برنساید» نامیده می‌شود، اما صورت‌های پیشین آن در کارهای کوشی و سپس فروبنیوس دیده می‌شود. در روایت‌های تاریخی دقیق‌تر، نام «لم کوشی - فروبنیوس» نیز به کار می‌رود؛ نام مشهورش یادآور این است که تاریخ نام‌گذاری ریاضیات همیشه به سادگی خود فرمول نیست. (منبع: Encyclopedia of Mathematics, Burnside Lemma).

۶.۱ بازنمایی‌های گروه

فرض کنید V فضای برداری بر $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$ باشد. یک بازنمایی خطی از G روی V ، نگاشت

$$D : G \longrightarrow GL(V), \quad D(e) = 1, \quad D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2)$$

است؛ در نتیجه $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. بُعد بازنمایی، همان بُعد V است. اگر تنها همانی به عملگر یکانی فرستاده شود، یا معادل آن اگر D یک‌به‌یک باشد، بازنمایی وفادار است؛ در غیر این صورت ناوفادار خواهد بود. ممکن است یک گروه دارای بازنمایی‌های متعددی با ابعاد مختلف باشد.

یک عمل گروهی روی مجموعه‌ای فاقد ساختار برداری را نیز می‌توان به بازنمایی تبدیل کرد: فضای برداری $\mathbb{F}[X]$ را با پایه‌ی صوری $\{|x\rangle : x \in X\}$ می‌سازیم و تعریف می‌کنیم

$$D(g)|x\rangle = |g \cdot x\rangle,$$

سپس عمل را با خطی بودن به ترکیب‌های خطی پایه‌ها گسترش می‌دهیم. انتخاب $X = G$ ما را به بازنمایی منتظم می‌رساند.

مثال حل‌شده: چرا یک بازنمایی می‌تواند ناوفادار باشد؟

گروه دوری $\mathbb{Z}_4$ را در نظر بگیرید و تعریف کنید

$$D(k) = (-1)^k \quad (k = 0, 1, 2, 3).$$

گام ۱. چون $(-1)^{k+\ell} = (-1)^k (-1)^\ell$ ، این یک بازنمایی یک‌بُعدی روی $\mathbb{C}$ است.
 گام ۲. $D(0) = D(2) = 1$. پس دو عنصر متفاوت به یک ماتریس فرستاده می‌شوند و بازنمایی وفادار نیست.
 گام ۳. هسته بازنمایی $\{0, 2\}$ است. تصویر آن دقیقاً $\mathbb{Z}_2 \cong \{+1, -1\}$ است؛ قضیه یکرختی توضیح می‌دهد چرا $\mathbb{Z}_4 / \{0, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$.

مثال حل‌شده: بازنمایی جایگشتی S_3 از عمل روی سه رأس

پایه $V = \mathbb{C}^3$ را e_1, e_2, e_3 می‌گیریم و $D(p)e_j = e_{p(j)}$ تعریف می‌کنیم. برای $p = (123)$ داریم

$$D(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D(p)^3 = I_3.$$

برای $s = (12)$:

$$D(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(s)^2 = I_3.$$

به جای ضرب کردن شش ماتریس، کافی است بدانیم $D(p)D(q)e_j = e_{p(q(j))}$ ؛ پس قانون بازنمایی به طور خودکار برقرار است. بردار $(1, 1, 1)^T$ در همه این ماتریس‌ها ثابت می‌ماند؛ این سرخ‌ی برای

تحویل پذیری است.

۷.۱ بازنمایی‌های معادل

دو بازنمایی D روی V و D' روی V' را معادل می‌گوییم اگر نگاشت خطی وارون‌پذیر $S : V \rightarrow V'$ وجود داشته باشد که برای تمام عناصر گروه

$$D'(g) = SD(g)S^{-1}$$

برقرار باشد. بنابراین معادل بودن درباره شکل ظاهری ماتریس‌ها نیست، بلکه درباره یکی بودن ساختار عمل گروه در دو دستگاه مختصات است. می‌توان بازنمایی‌ها را تا حد همین هم‌ارزی دسته‌بندی کرد.

مثال حل‌شده: تعویض پایه، بدون تغییر فیزیک

بازنمایی $\mathbb{Z}_2 = \{e, s\}$ را با $D(s) = \text{diag}(1, -1)$ بگیرید. ماتریس

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = S$$

وارون‌پذیر است. محاسبه مستقیم می‌دهد:

$$SD(s)S^{-1} = \begin{pmatrix} \cdot & 1 \\ 1 & \cdot \end{pmatrix} = \sigma_x.$$

پس بازنمایی‌ای که در یک پایه «علامت مؤلفه دوم» را برمی‌گرداند، در پایه دیگری «دو مؤلفه را جابه‌جا» می‌کند. دو نمایش ماتریسی متفاوت‌اند اما بازنمایی‌ها معادل‌اند.

۸.۱ بازنمایی‌های یکانی و متعامد

اگر V به ضرب داخلی هرمیتی (در حالت مختلط) یا متقارن (در حالت حقیقی) مجهز باشد، بازنمایی را یکانی یا متعامد می‌خوانیم اگر

$$\langle D(g)x, D(g)y \rangle = \langle x, y \rangle \quad (g \in G, x, y \in V).$$

در پایه متعامد هنجار، این شرط به $D(g)^\dagger D(g) = I$ یا $D(g)^T D(g) = I$ تبدیل می‌شود. همه بازنمایی‌های متناهی بُعد گروه‌های متناهی روی $\mathbb{C}$ را می‌توان با تغییر مناسب ضرب داخلی، یکانی کرد؛ درباره گروه‌های فشرده نیز با فرض پیوستگی و شرایط معمول بازنمایی متناهی بُعد چنین است. برعکس، بازنمایی‌های متناهی بُعد غیر بدیهی گروه لورنتس الزاماً یکانی نیستند.

مثال حل‌شده: ساخت ضرب داخلی ناوردا به وسیله میانگین‌گیری

فرض کنید $D : G \rightarrow GL(V)$ بازنمایی یک گروه متناهی باشد و $\langle \cdot, \cdot \rangle$ هر ضرب داخلی مثبت معین اولیه. تعریف می‌کنیم

$$\langle u, v \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle D(g)u, D(g)v \rangle.$$

گام ۱. این عبارت هرمیتی و نسبت به هر ورودی خطی یا پادخطی است، چون میانگین ضرب‌های داخلی است.

گام ۲. اگر $u \neq 0$ و $D(g)$ وارون‌پذیری باعث $\|D(g)u\|^2 > 0$ می‌شود؛ پس $\langle u, u \rangle_G > 0$.

گام ۳. برای $h \in G$ داریم

$$\langle D(h)u, D(h)v \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \langle D(gh)u, D(gh)v \rangle.$$

چون $g \mapsto gh$ جایگشتی از عناصر گروه است، این مجموع با مقدار اولیه برابر می‌شود. پس ضرب داخلی جدید ناورداست؛ اگر ماتریس‌های گرام آن M باشد، $D(h)^\dagger M D(h) = M$. با انتخاب پایه متعامدهنجار نسبت به M ، تمام $D(h)$ یکانی می‌شوند.

پیوند با فیزیک: چرا تقارن کوانتومی با یکانیت همراه است؟

یکانیت ضرب داخلی را حفظ می‌کند، پس احتمال‌های $|\langle \psi | \phi \rangle|^2$ تحت تقارن تغییر نمی‌کنند. در همین جاست که یک ادعای ظاهراً انتزاعی ریاضی به شرطی فیزیکی درباره پایستگی احتمال تبدیل می‌شود.

ماتریس‌های یک بازنمایی ۹.۱

اگر V متناهی‌بُعد باشد و $\{e_j\}_{j=1}^n$ پایه‌ای برای آن انتخاب کنیم، عمل $D(g)$ را با ضرایب

$$D(g)e_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}(g)e_i$$

بیان می‌کنیم. در این قرارداد، i نمایه سطر و j نمایه ستون است و قانون گروهی به ضرب ماتریسی تبدیل می‌شود:

$$D_{ij}(g_1 g_2) = \sum_k D_{ik}(g_1) D_{kj}(g_2), \quad D_{ij}(e) = \delta_{ij}.$$

در تغییر پایه وارون‌پذیر، ماتریس‌ها با تبدیل تشابه دگرگون می‌شوند؛ با قرارداد پایه‌گذاری مناسب $D'(g) = SD(g)S^{-1}$. اگر ضرب داخلی و پایه هر دو متعامدهنجار باشند، ماتریس‌های بازنمایی یکانی یا متعامد خواهند بود.

مثال حل‌شده: رد و دترمینان تحت تغییر پایه

برای هر ماتریس وارون‌پذیر S ، داریم $A' = SAS^{-1}$. با چرخه‌ای بودن رد:

$$\text{Tr } A' = \text{Tr}(SAS^{-1}) = \text{Tr}(AS^{-1}S) = \text{Tr } A.$$

همچنین $\det A' = \det S \det A \det S^{-1} = \det A$. پس مقادیر ویژه، رد و دترمینان به انتخاب پایه وابسته نیستند. اما مثلاً درایه A_{11} عموماً تغییر می‌کند. این تمایز توضیح می‌دهد چرا کاراکتر یک بازنمایی، که بر حسب رد تعریف می‌شود، ابزار طبقه‌بندی قدرتمندی است.

۱۰.۱ عملیات روی بازنمایی‌ها

برای یک بازنمایی ماتریسی $D(g)$ می‌توان سه بازنمایی دیگر ساخت:

$$D^\vee(g) = (D(g)^T)^{-1} = D(g^{-1})^T, \quad D^\#(g) = (D(g)^\dagger)^{-1}, \quad \overline{D}(g) = D(g)^*.$$

این‌ها به ترتیب بازنمایی دوگان یا پادوردایی، بازنمایی هرمیتی دوگان و بازنمایی مزدوج مختلط نامیده می‌شوند. بازنمایی دوم مزدوج مختلط اول است. برای بازنمایی یکانی، $D^\vee = \overline{D}$ و $D^\# = D$. $D^\vee = D$ بازنمایی حقیقی متعامد.

اگر D_1, D_2 بازنمایی‌های یک گروه باشند، جمع مستقیم روی $V_1 \oplus V_2$ به صورت بلوکی

$$(D_1 \oplus D_2)(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & \cdot \\ \cdot & D_2(g) \end{pmatrix}$$

و ضرب تانسوری روی $V_1 \otimes V_2$ با قانون

$$(D_1 \otimes D_2)(g)(u \otimes v) = D_1(g)u \otimes D_2(g)v$$

تعریف می‌شوند. بُعد جمع مستقیم برابر مجموع ابعاد، و بُعد ضرب تانسوری برابر حاصل ضرب آن‌هاست.

مثال حل‌شده: چه اتفاقی برای دو اسپین $\frac{1}{2}$ می‌افتد؟

فضای هر اسپین $\mathbb{C}^2$ است، پس فضای دو اسپین $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ چهار بُعد دارد. عمل یک دوران، $D^{(1/2)}(R) \otimes D^{(1/2)}(R)$ خواهد بود. با جمع دو اسپین، حالت‌های متقارن

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1, 0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

یک زیر فضای سه‌بُعدی می‌سازند، و حالت پادمتقارن

$$|0, 0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

یک زیر فضای یک‌بُعدی است. بنابراین $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$. بخش‌های بعد توضیح می‌دهند چگونه چنین تجزیه‌ای را با کاراکترها و بدون حدس زدن حالت‌ها به دست آوریم.

۱۱.۱ کاراکتر بازنمایی

کاراکتر بازنمایی D تابع

$$\chi_D(g) = \text{Tr } D(g)$$

است. چون رد زیر تبدیل تشابه ثابت می‌ماند، کاراکتر مستقل از پایه است. همچنین برای هر $h \in G$:

$$\chi_D(hgh^{-1}) = \text{Tr}(D(h)D(g)D(h)^{-1}) = \chi_D(g).$$

پس کاراکتر روی هر کلاس مزدوج ثابت است؛ به چنین تابعی تابع کلاسی می‌گوییم. اگر بازنمایی یکانی باشد، $\chi(g^{-1}) = \chi(g)^*$ و نیز

$$\chi_{D_1 \oplus D_2}(g) = \chi_{D_1}(g) + \chi_{D_2}(g), \quad \chi_{D_1 \otimes D_2}(g) = \chi_{D_1}(g)\chi_{D_2}(g).$$

بعدها نشان می‌دهیم که برای بازنمایی‌های متناهی بُعد گروه‌های متناهی روی $\mathbb{C}$ ، کاراکتر بازنمایی را تا حد هم‌ارزی به‌طور کامل تعیین می‌کند.

مثال حل‌شده: محاسبه سریع کاراکتر یک بازنمایی جایگشتی

در بازنمایی جایگشتی S_r روی سه رأس، هر ماتریس، پایه‌ها را جابه‌جا می‌کند. درایه قطری $D(p)_{ii}$ برابر ۱ است اگر $p(i) = i$ و در غیر این صورت صفر است. بنابراین

$$\chi(p) = \#\{i : p(i) = i\}.$$

گام ۱. همانی هر سه رأس را ثابت می‌گذارد، پس $\chi(e) = 3$.
 گام ۲. هر ترانواده یک رأس را ثابت می‌گذارد، پس $\chi((12)) = 1$.
 گام ۳. دوره‌های سه‌تایی هیچ رأس ثابتی ندارند، پس $\chi((123)) = 0$.
 به این ترتیب جدول کاراکتر روی سه کلاس، $(3, 1, 0)$ است، بی‌آنکه نیاز باشد همه ماتریس‌ها را جداگانه بنویسیم.

یادداشت تاریخی: سال ۱۸۹۶؛ یک «رد» که دری تازه باز کرد

گئورگ فروبنیوس در سال ۱۸۹۶ مفهوم کاراکتر را برای گروه‌های متناهی به‌صورت نظام‌مند گسترش داد؛ حتی جالب‌تر اینکه در نخستین صورت‌بندی او، کاراکترها پیش از پیوند نهایی‌شان با رد ماتریس‌های بازنمایی معرفی شدند. ارتباط کامل با بازنمایی‌های ماتریسی در کارهای بعدی او شکل گرفت. (منبع: زندگی‌نامه فروبنیوس در MacTutor).

۱۲.۱ زیرفضاهای ناورد؛ تحویل‌پذیری و تحویل‌ناپذیری

اگر D روی فضای V عمل کند، زیرفضای $W \subseteq V$ را ناورد می‌نامیم اگر $D(g)W \subseteq W$ برای تمام $g \in G$. بازنمایی زمانی تحویل‌ناپذیر (irreducible) است که تنها زیرفضاهای ناوردی آن، $\{0\}$ و V باشند. اگر زیرفضای ناوردی نابدهی وجود داشته باشد، بازنمایی تحویل‌پذیر است.

در حالت تحویل‌پذیر، ممکن است بتوان فضای V را به جمع مستقیم دو زیرفضای ناورد $V = W \oplus W'$ تجزیه کرد؛ آن‌گاه بازنمایی تجزیه‌پذیر است. اگر چنین مکمل ناوردایی وجود نداشته باشد، بازنمایی تجزیه‌ناپذیر خواهد بود. در پایه سازگار با W :

$$D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & B(g) \\ \cdot & D_2(g) \end{pmatrix}.$$

تجزیه‌پذیری یعنی با انتخاب پایه مناسب بتوان بلوک $B(g)$ را برای همه g صفر کرد. برای یک بازنمایی یکانی، اگر W ناورد باشد، متمم عمودی $W^\perp$ نیز ناورد است؛ پس هر بازنمایی یکانی متناهی بُعد به جمع مستقیمی از بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر یکانی (UIR) تجزیه می‌شود. برای گروه‌های متناهی روی $\mathbb{C}$ ، این نتیجه همان محتوای قضیه ماشکه است.

مثال حل‌شده: چگونه یک بازنمایی سه‌بُعدی به $1 + 2$ می‌شکند؟

همان بازنمایی جایگشتی S_3 روی $\mathbb{C}^3$ را بگیرید. چون هر جایگشت جمع مؤلفه‌ها را نگه می‌دارد، دو زیرفضای زیر ناورد هستند:

$$W_1 = \text{span}\{(1, 1, 1)^T\}, \quad W_2 = \{(x, y, z)^T : x + y + z = 0\}.$$

گام ۱. $\dim W_1 = 1, \dim W_2 = 2$ و $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. پس $\mathbb{C}^3 = W_1 \oplus W_2$.
 گام ۲. اگر $v \in W_2$ ، جایگشت مؤلفه‌ها جمع صفر را حفظ می‌کند؛ بنابراین $D(p)v \in W_2$.
 گام ۳. W_1 بازنمایی بدیهی را حمل می‌کند. روی W_2 ، بازنمایی دو‌بُعدی استاندارد قرار دارد که تحویل‌ناپذیر است؛ اگر خطی ناورد بر تمام جایگشت‌ها وجود داشت، باید یک بردار ویژه مشترک برای دو ترانهادۀ غیرجابه‌جا می‌داشت؛ چنین خطی در صفحه $x + y + z = 0$ وجود ندارد.
 پس $3_{\text{perm}} = 1 \oplus 2$.

مثال حل‌شده: تحویل‌پذیر، اما تجزیه‌ناپذیر: یک دام رایج

گروه جمعی $(\mathbb{R}, +)$ را با ماتریس‌های

$$D(a) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

بازنمایی کنید. از $D(a)D(b) = D(a+b)$ می‌دانیم بازنمایی است.
 گام ۱. خط $W = \text{span}\{e_1\}$ ناورد است، چون $D(a)e_1 = e_1$. پس تحویل‌پذیر است.
 گام ۲. فرض کنید خط مکمل ناوردی دیگری به صورت $U = \text{span}\{(x, y)^T\}$ وجود دارد. برای مکمل بودن باید $y \neq 0$. ناوردایی یعنی برای هر a ، بردار $(x + ay, y)$ مضربی از (x, y) باشد.
 گام ۳. از مؤلفه دوم ضریب تناسب ۱ به دست می‌آید؛ از مؤلفه اول $ay = 0$ برای همه a نتیجه می‌شود که با $y \neq 0$ ناسازگار است.
 پس D تحویل‌پذیر اما تجزیه‌ناپذیر است. این مثال نشان می‌دهد چرا شرط متناهی یا فشرده بودن گروه در قضیه تجزیه کامل اهمیت دارد.

یادداشت تاریخی: ماشکه و معجزه «شکستن به قطعات ساده»

هاینریش ماشکه در سال 1899 قضیه تجزیه کامل بازنمایی‌های گروه متناهی را منتشر کرد (حالت خاصی را پیش‌تر، در 1898، بررسی کرده بود). اهمیت قضیه را می‌توان با این جمله خلاصه کرد: کافی است قطعات تحویل‌ناپذیر را بشناسیم؛ بقیه بازنمایی‌ها با کنارهم گذاشتن آن قطعات ساخته می‌شوند. (منبع: MacTutor, Heinrich Maschke).

۱۳.۱ لم شور: اثبات و کاربردهای بنیادی

این لم یکی از ستون‌های نظریه بازنمایی است. فرض کنید $D : G \rightarrow GL(V)$ و $D' : G \rightarrow GL(V')$ دو بازنمایی تحویل‌ناپذیر روی فضاهای مختلط باشند، و نگاشت خطی $T : V \rightarrow V'$ برای همه g رابطه

$$TD(g) = D'(g)T$$

را ارضا کند. به T عملگر میان‌باف (intertwiner) می‌گوییم. لم نخست شور می‌گوید: یا $T = 0$ ، یا T وارون‌پذیر است و دو بازنمایی معادل‌اند.

اثبات. هسته $N(T) = \{v : Tv = 0\}$ تحت D ناورد است، چون

$$TD(g)v = D'(g)Tv = 0.$$

به همین ترتیب تصویر $R(T) = T(V)$ تحت D' ناورد است. اگر $T \neq 0$ ، تحویل‌ناپذیری حکم می‌کند $N(T) = \{0\}$ و $R(T) = V'$. بنابراین T یک‌به‌یک و پوشا، و در نتیجه وارون‌پذیر است. $\square$

لم دوم شور. اگر $V = V'$ و $D = D'$ یک بازنمایی تحویل‌ناپذیر متناهی بُعد روی $\mathbb{C}$ باشد، هر T که با تمام $D(g)$ ‌ها جابه‌جا شود، از شکل

$$T = \lambda I$$

است. برای اثبات، یک مقدار ویژه λ از T انتخاب کنید. عملگر $T - \lambda I$ هم میان‌باف است و هم هسته ناصفر دارد؛ پس به حکم بخش نخست، باید صفر باشد.

۱.۱۳.۱ یکتایی تجزیه کامل تا حد چندگانگی

اگر یک بازنمایی به دو روش به فضاهای تحویل‌ناپذیر تجزیه شده باشد، نگاشت «گرفتن مؤلفه یک بردار در زیرفضای تجزیه دوم» میان‌باف است. لم شور می‌گوید این نگاشت میان دو جزء نامعادل صفر است. پس فقط مؤلفه‌های معادل دو تجزیه با هم ارتباط دارند. نتیجه این است که گونه‌های تحویل‌ناپذیر و تعداد تکرار هر گونه یکتا هستند، هرچند انتخاب زیرفضاهای متناظر، در حضور چندگانگی ممکن است یکتا نباشد.

اگر بازنمایی را به صورت

$$V = \bigoplus_{\alpha} (\mathbb{C}^{m_{\alpha}} \otimes V_{\alpha})$$

بنویسیم، V_{α} بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر نامعادل و m_{α} تعداد تکرارشان است. جمع همه اجزایی که از یک گونه α هستند، بخش ایزوتیپی آن گونه نام دارد و مستقل از روش تجزیه است.

مثال حل‌شده: از لم شور تا ساختار یک هامیلتونی متقارن

فرض کنید $U(g)$ یک بازنمایی تحویل‌ناپذیر مختلط و H هامیلتونی متقارن تحت گروه باشد، یعنی $[H, U(g)] = 0$ برای هر g .

گام ۱. طبق لم شور، $H = EI$ روی این زیرفضا.

گام ۲. اگر H هرمیتی باشد، $E \in \mathbb{R}$. بنابراین همه حالت‌های این زیرفضای d بُعدی دارای انرژی یکسان‌اند: تبهگنی تقارنی دست‌کم d است.

گام ۳. اگر یک بازنمایی تحویل‌ناپذیر m بار تکرار شود، شکل عمومی هامیلتونی روی بخش متناظر $H = A_m \otimes I_d$ است؛ لذا تقارن، ترکیب بین کپی‌های معادل را مجاز می‌گذارد، ولی در نمایه‌های داخلی بازنمایی تحویل‌ناپذیر با ماتریس یکانی عمل می‌کند.

یادداشت تاریخی: ایسای شور؛ از ریاضیات ناب تا مکانیک کوانتومی

ایسای شور شاگرد فروبنیوس بود و در فاصله حدود 1904–1907 بر بازنمایی‌ها و کاراکترهای گروهی کار کرد؛ «لم شور» از آن دوران برآمد. با پیدایش مکانیک کوانتومی در دهه 1920، نظریه‌ای که در ابتدا بسیار انتزاعی به نظر می‌رسید به زبان طبیعی تبهگنی انرژی و قواعد گزینش بدل شد. (منبع: زندگی‌نامه شور در MacTutor)

۲.۱۳.۱ میانگین‌گیری روی گروه و رابطه‌های تعامد

برای گروه متناهی، میانگین تابع $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ را تعریف می‌کنیم:

$$\mathcal{M}(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g).$$

این عملگر خطی، مثبت برای توابع نامنفی، نرمال‌شده ($\mathcal{M}(1) = 1$)، و تحت انتقال چپ، راست و وارون گرفتن ناورد است. می‌توان همین میانگین‌گیری را روی عملگرهای خطی نیز انجام داد.

اگر D و D' تحویل‌ناپذیر باشند و $S: V \rightarrow V'$ هر نگاشت خطی، تعریف کنید

$$T_S = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D'(g^{-1}) S D(g).$$

با جایگزینی $g \mapsto gh$ نشان می‌دهیم $T_S D(h) = D'(h) T_S$. پس T_S یک میان‌باف است. اگر D' و D نامعادل باشند، لم شور حکم می‌کند $T_S = 0$. اگر $D' = D$ ، داریم $T_S = c(S)I$ ؛ گرفتن رد نشان می‌دهد $c(S) = \text{Tr } S/d$ که $d = \dim V$ است.

برای بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر یکانی نامعادل $D^{(\alpha)}$ و $D^{(\beta)}$ ، و $d_\alpha = \dim D^{(\alpha)}$ ، با انتخاب S به شکل یک ماتریس تک‌درایه و مقایسه درایه‌ها به رابطه تعامد بزرگ می‌رسیم:

$$\left[\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}}{d_\alpha} \right].$$

برای توابع روی گروه، ضرب داخلی $\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g f(g)^* h(g)$ را در نظر می‌گیریم. تعامد درایه‌ها یعنی

توابع $\sqrt{d_\alpha} D_{ij}^{(\alpha)}(g)$ متعامدهنجارند. از آنجا که فضای $L^2(G)$ بُعد $|G|$ دارد، در ابتدا می‌فهمیم

$$\sum_{\alpha} d_{\alpha}^2 \leq |G|.$$

با جمع کردن روی نمایه‌های قطری، رابطه تعامد کاراکترها حاصل می‌شود:

$$\langle \chi_{\alpha}, \chi_{\beta} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_{\alpha}(g)^* \chi_{\beta}(g) = \delta_{\alpha\beta}.$$

از آنجا که کاراکترها تابع کلاسی اند، تعداد بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر نامعادل، حداکثر تعداد کلاس‌های مزدوج است. اگر

$$\chi_D = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \chi_{\alpha},$$

آنگاه $m_{\alpha} = \langle \chi_{\alpha}, \chi_D \rangle$ و $\langle \chi_D, \chi_D \rangle = \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2$. بنابراین برای بازنمایی ناصفر، D زمانی تحویل‌ناپذیر است که $\langle \chi_D, \chi_D \rangle = 1$.

مثال حل‌شده: جدول کاراکتر کامل S_3 را به دست آوریم

سه کلاس مزدوج C_e, C_t, C_c به اندازه‌های ۱، ۳، ۲ داریم. به همین تعداد باید بازنمایی تحویل‌ناپذیر داشته باشیم. دو بازنمایی یک‌بُعدی روشن‌اند: بدیهی با کاراکتر $(1, 1, 1)$ ، و علامت با $(1, -1, 1)$. شرط مجموع مربعات ابعاد می‌دهد

$$1^2 + 1^2 + d^2 = 6 \Rightarrow d = 2.$$

بازنمایی جایگشتی سه‌بُعدی بخش قبل، جمع بدیهی و استاندارد دو‌بُعدی بود؛ پس کاراکتر استاندارد از $(2, 0, -1) = (1, 1, 1) - (3, 1, 0)$ به دست می‌آید.

کلاس	$[e]$	$[(12)]$	$[(123)]$
اندازه	۱	۳	۲
χ_1	۱	۱	۱
χ_{sgn}	۱	-۱	۱
χ_2	۲	۰	-۱

مثلاً تعامد بدیهی و استاندارد را مستقیم بررسی کنید:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1(1)(2) + 3(1)(0) + 2(1)(-1)}{6} = 0.$$

و نرم استاندارد:

$$\|\chi_2\|^2 = \frac{1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{6} = 1.$$

پس بازنمایی استاندارد واقعاً تحویل‌ناپذیر است.

۳.۱۳.۱ بازنمایی‌های منتظم چپ و راست

روی فضای توابع $L^2(G)$ ، با پایه $\{|h\rangle : h \in G\}$ ، دو بازنمایی تعریف می‌کنیم:

$$(L_g f)(h) = f(g^{-1}h), \quad (R_g f)(h) = f(hg).$$

هر دو یکانی‌اند، $L_g R_k = R_k L_g$ ، و روی پایه‌ها

$$L_g |h\rangle = |gh\rangle, \quad R_g |h\rangle = |hg^{-1}\rangle.$$

زیرا اگر $g \neq e$ ، هیچ بردار پایه‌ای تحت جابه‌جایی چپ یا راست در جای خود نمی‌ماند، کاراکتر هر دو بازنمایی منتظم برابر است با

$$\chi_{\text{reg}}(g) = |G| \delta_{g,e}.$$

چندگانگی بازنمایی تحویل‌ناپذیر α در بازنمایی منتظم از ضرب داخلی کاراکترها حساب می‌شود:

$$m_\alpha = \langle \chi_\alpha, \chi_{\text{reg}} \rangle = \chi_\alpha(e) = d_\alpha.$$

پس هر بازنمایی تحویل‌ناپذیر d_α بُعدی دقیقاً d_α بار در بازنمایی منتظم ظاهر می‌شود؛ نتیجه:

$$\sum_{\alpha} d_\alpha^2 = |G|.$$

در نتیجه توابع $\sqrt{d_\alpha} D_{ij}^{(\alpha)}(g)$ یک پایه متعامده‌نجار کامل برای $L^2(G)$ تشکیل می‌دهند. هر تابع به صورت

$$f(g) = \sum_{\alpha} \sum_{i,j} c_{ij}^{(\alpha)} \sqrt{d_\alpha} D_{ij}^{(\alpha)}(g), \quad c_{ij}^{(\alpha)} = \langle \sqrt{d_\alpha} D_{ij}^{(\alpha)}, f \rangle$$

بسط می‌یابد و $\|f\|^2 = \sum_{\alpha,i,j} |c_{ij}^{(\alpha)}|^2$. عملگرهای L و R روی دو نمایه متفاوت این ضرایب اثر می‌گذارند؛ این با جابه‌جاشدنشان سازگار است. اگر f تابع کلاسی باشد، این بسط به

$$f(g) = \sum_{\alpha} f_{\alpha} \chi_{\alpha}(g), \quad f_{\alpha} = \langle \chi_{\alpha}, f \rangle$$

کاهش می‌یابد. از کامل بودن کاراکترها، نتیجه اساسی دیگر حاصل می‌شود:

$$\#\{\text{کلاس‌های مزدوج}\} = \#\{\text{بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر نامعادل}\}.$$

مثال حل‌شده: بازنمایی منتظم S_3 : چرا عدد شش دوباره پیدا می‌شود؟

طبق جدول پیشین، S_3 دو بازنمایی یک‌بُعدی و یک بازنمایی دو‌بُعدی دارد. بازنمایی منتظم شش‌بُعدی است و طبق فرمول چندگانگی:

$$D_{\text{reg}} \cong 1 \oplus \text{sgn} \oplus 2 \oplus 2.$$

بُعد سمت راست $6 = 1 + 1 + 2 + 2$ است. در سطح کاراکترها:

$$\chi_{\text{reg}} = (1, 1, 1) + (1, -1, 1) + 2(2, 0, -1) = (6, 0, 0).$$

پس $\chi_{\text{reg}}(e) = 6$ و در سایر عناصر صفر است؛ در این محاسبه دو قضیه مستقل به هم می‌رسند.

مثال حل‌شده: فوریه روی یک گروه دوری؛ صورت گسسته یک اندیشه بزرگ

برای $G = \mathbb{Z}_n$ ، همه بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر مختلط یک‌بُعدی‌اند:

$$\chi_k(m) = e^{\imath \pi i k m / n}, \quad k, m = 0, \dots, n-1.$$

تعامد را مستقیم محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \chi_k(m)^* \chi_\ell(m) = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} e^{\imath \pi i (\ell - k) m / n} = \delta_{k\ell}.$$

اگر $k \neq \ell$ ، مجموع یک تصاعد هندسی با نسبت $z \neq 1$ و $z^n = 1$ است، پس صفر می‌شود. بنابراین بسط یک تابع دلخواه $f(m)$ روی $\mathbb{Z}_n$ همان تبدیل فوریه گسسته است:

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{n} \sum_m f(m) e^{-\imath \pi i k m / n}, \quad f(m) = \sum_k \hat{f}(k) e^{\imath \pi i k m / n}.$$

یعنی تحلیل فوریه، نظریه بازنمایی گروه‌های آبلی در لباس آشنای پردازش سیگنال است.

۴.۱۳.۱ مزدوج مختلط؛ بازنمایی حقیقی، مختلط و شبه‌حقیقی

اگر $D^{(\alpha)}$ تحویل‌ناپذیر و یکانی باشد، $D^{(\alpha)*}$ نیز چنین است. اگر کاراکتر $\chi_\alpha(g)$ برای بعضی عناصر حقیقی نباشد، بازنمایی مزدوج مختلط با خود آن نامعادل است و بازنمایی از نوع مختلط است. اگر کاراکتر همه‌جا حقیقی باشد، مزدوج مختلط با خود بازنمایی معادل است؛ اما دو حالت متفاوت ممکن است:

- حقیقی: می‌توان پایه‌ای انتخاب کرد که همه ماتریس‌های بازنمایی حقیقی باشند.
- شبه‌حقیقی (شبه‌واقعی): بازنمایی معادل مزدوج مختلط خود است، ولی هیچ پایه یکانی‌ای همه ماتریس‌ها را به طور هم‌زمان حقیقی نمی‌کند.

در حالت کاراکتر حقیقی، یک ماتریس یکانی میان‌باف C وجود دارد که $D(g)^* = CD(g)C^{-1}$. به کمک لم شور می‌توان آن را چنان تنظیم کرد که $C^T = \pm C$ ؛ علامت مثبت حالت حقیقی و علامت منفی حالت شبه‌حقیقی را مشخص می‌کند. یک آزمون تکمیلی، شاخص فروبنیوس - شور است:

$$\nu_\alpha = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\alpha(g^2) \in \{+1, 0, -1\},$$

که به ترتیب حالت‌های حقیقی، مختلط و شبه‌حقیقی را تشخیص می‌دهد.

مثال حل‌شده: یک بازنمایی شبه‌حقیقی با ماتریس‌های پائولی

گروه کواترنیون $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ را در بازنمایی دو بُعدی

$$D(1) = I_2, \quad D(-1) = -I_2, \quad D(i) = i\sigma_x, \quad D(j) = i\sigma_y, \quad D(k) = -i\sigma_z$$

در نظر بگیرید. قرارداد علامت‌ها طوری است که $D(i)D(j) = D(k)$ و $i^2 = j^2 = k^2 = -1$.
 ردها عبارت‌اند از $\chi(1) = 2, \chi(-1) = -2, \chi(\pm i) = \chi(\pm j) = \chi(\pm k) = 0$ و گام ۱. مربع دو عضو ± 1 برابر ۱ است.
 گام ۲. مربع هر یک از شش عضو $\pm i, \pm j, \pm k$ برابر -1 است.
 گام ۳. شاخص را محاسبه می‌کنیم:

$$\nu = \frac{1}{8} [2\chi(1) + 6\chi(-1)] = \frac{1}{8} (4 - 12) = -1.$$

پس این بازنمایی شبه‌حقیقی است؛ واقعی بودن کاراکترها به‌تنهایی برای یافتن پایه کاملاً حقیقی کافی نیست.

۵.۱۳.۱ حاصل ضرب بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر؛ مسئله کلبش - گوردان

اگر $D^{(\alpha)}$ و $D^{(\beta)}$ تحویل‌ناپذیر باشند، ضرب تانسوری آن‌ها عموماً تحویل‌پذیر است:

$$D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)} \cong \bigoplus_{\gamma} N_{\alpha\beta}^{\gamma} D^{(\gamma)}, \quad N_{\alpha\beta}^{\gamma} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

ضرایب چندگانگی بدون ساختن ماتریس‌های بزرگ به‌دست می‌آیند:

$$N_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\gamma}(g)^* \chi_{\alpha}(g) \chi_{\beta}(g).$$

پایه‌ای که ضرب تانسوری را به بلوک‌های تحویل‌ناپذیر تبدیل می‌کند با ضرایب کلبش - گوردان بیان می‌شود؛ این ضرایب به قرارداد پایه و فاز وابسته‌اند.

مثال حل‌شده: محاسبه کامل $2 \otimes 2$ در S_3

از جدول کاراکترها، $\chi_2 = (2, 0, -1)$. پس کاراکتر ضرب تانسوری آن با خودش

$$\chi_{2 \otimes 2} = (2, 0, -1)^2 = (4, 0, 1).$$

ضرایب را با وزن اندازه کلاس‌ها $(1, 3, 2)$ حساب می‌کنیم:

$$N_{22}^1 = \frac{1}{6} (1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1,$$

$$N_{22}^{\text{sgn}} = \frac{1}{6} (1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1,$$

$$N_{22}^2 = \frac{1}{6} (1 \cdot 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) \cdot 1) = 1.$$

بنابراین

$$2 \otimes 2 = 1 \oplus \text{sgn} \oplus 2,$$

و ابعاد نیز سازگارند: $2 \times 2 = 1 + 1 + 2$. در یک گروه آبدی، تمام بازنمایی‌های تحویل‌ناپذیر مختلط یک‌بُعدی‌اند؛ در یک گروه ناجابجایی، دست‌کم یکی از آن‌ها چندبُعدی است.

یادداشت تاریخی: نام دو ریاضی‌دان و مسئله اتصال اسپین‌ها

آلفرد کلبش و پاول گوردان در سده نوزدهم به مسائل نظریه ناورداهای ترکیب بازنمایی‌های جبری می‌پرداختند، دهه‌ها پیش از صورت‌بندی مکانیک کوانتومی. پس از ظهور فیزیک کوانتومی روشن شد دستگاه محاسباتی آنان برای ترکیب تکانه‌های زاویه‌ای دقیقاً همان چیزی است که فیزیک‌دانان نیاز دارند. (نگاه کنید به مرور تاریخی Angular Momentum Diagrams).

۱۴.۱ جبر گروه

اگر G گروهی متناهی و $\mathbb{F}$ یک میدان باشد، جبر گروه $\mathbb{F}[G]$ مجموعه تمام ترکیب‌های خطی صوری عناصر گروه است:

$$\mathbb{F}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g : a_g \in \mathbb{F} \right\}.$$

این ساختار از سه زاویه دیده می‌شود: نخست، یک فضای برداری روی $\mathbb{F}$ با پایه عناصر گروه و بُعد $|G|$ است؛ دوم، یک حلقه دارای یککه است که ضرب آن با استفاده از قانون ضرب G و توزیع‌پذیری تعریف می‌شود؛ سوم، با ضرب اسکالر از $\mathbb{F}$ ، یک جبر روی میدان $\mathbb{F}$ است. برای

$$a = \sum_g a_g g, \quad b = \sum_h b_h h$$

داریم

$$ab = \sum_{g,h \in G} a_g b_h (gh).$$

یکه این جبر همان $1_{\mathbb{F}} e_G$ است. اگر گروه آبدی باشد، جبر گروه جابه‌جایی است؛ اگر نباشد، جبر گروه نیز ناجابجایی است. میدان $\mathbb{F}$ را می‌توان با شناسایی $c \leftrightarrow c e_G$ زیرمجموعه‌ای از جبر دانست.

مثال حل‌شده: جبر گروه $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ از ضرب صوری تا تصویرگرهای واقعی

بگذارید $\mathbb{Z}_2 = \{e, s\}$ با $s^2 = e$. هر عنصر جبر به صورت $a = xe + ys$ است و

$$(xe + ys)(ue + vs) = (xu + yv)e + (xv + yu)s.$$

دو عنصر ویژه را تعریف می‌کنیم:

$$p_+ = \frac{e + s}{2}, \quad p_- = \frac{e - s}{2}.$$

گام ۱. با بسط مربع:

$$p_+^2 = \frac{e + 2s + s^2}{4} = \frac{e + s}{2} = p_+, \quad p_-^2 = p_-.$$

گام ۲. حاصل ضرب $p_+ p_- = (e - s^2)/4 = 0$ و $p_+ + p_- = e$.
 گام ۳. بنابراین $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \mathbb{C}p_+ \oplus \mathbb{C}p_-$. هر یک از این دو راستای یک بازنمایی یک‌بُعدی را می‌سازد:
 $sp_+ = p_+$ و $sp_- = -p_-$. جبر گروه، هر دو بازنمایی تحویل‌ناپذیر را در درون خود جای داده است.

پیوند با فیزیک: پروژکتور تقارن در مکانیک کوانتومی

اگر $U(s)^2 = I$ عملگر وارونگی یا پاریته باشد، عملگرهای

$$P_{\pm} = \frac{I \pm U(s)}{2}$$

تصویرگرهای متعامدی بر فضاهای زوج و فردند. آنچه در جبر گروه به صورت $p_{\pm}$ نوشته شد، پس از اعمال بازنمایی D دقیقاً به این پروژکتورهای آشنای کوانتومی تبدیل می‌شود.

۱۵.۱ بازنمایی‌های گروه و مدول‌های جبر گروه

بازنمایی D از G روی V ، یک عمل طبیعی از جبر $\mathbb{F}[G]$ روی بردارهای V تعریف می‌کند:

$$\left(\sum_i a_i g_i \right) \cdot v = \sum_i a_i D(g_i)v.$$

از این دیدگاه V یک مدول چپ روی حلقه $\mathbb{F}[G]$ است. «مدول» تعمیم فضای برداری است، با این تفاوت که ضرایب به جای آنکه فقط از یک میدان بیایند، از یک حلقه می‌آیند. هر زیر فضای ناوردا زیرمدول است؛ و بازنمایی تحویل‌ناپذیر با مدول ساده متناظر می‌شود.

در جبر گروه، عنصری p را خودتوان می‌گوییم اگر $p^2 = p$. دو خودتوان p, q را متعامد می‌خوانیم اگر $pq = qp = 0$. خودتوان اولیه را نمی‌توان به جمع دو خودتوان متعامد ناصفر شکست. تصویرگرهای جبری در تجزیه بازنمایی منتظم و ساخت مدول‌های تحویل‌ناپذیر نقش کلیدی دارند؛ این روش در فصل بعد برای S_n اهمیت پیدا می‌کند. بحث حاضر برای میدان عمومی $\mathbb{F}$ تعریف‌پذیر است، ولی در بخش‌های بعدی کتاب عمدتاً $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ انتخاب می‌شود.

یادداشت آموزشی و ویرایشی: یک شرط فنی مهم که نباید پنهان بماند

تجزیه هر بازنمایی به مجموعی از مؤلفه‌های تحویل‌ناپذیر و روش ساخت آن‌ها به وسیله خودتوان‌ها، در حالت نیمه‌ساده جبر گروه به خوبی کار می‌کند؛ برای گروه متناهی، این امر وقتی $|G| \nmid \text{char } \mathbb{F}$ برقرار باشد تضمین می‌شود. در میدان‌هایی که مشخصه‌شان مرتبه گروه را تقسیم می‌کند، تجزیه کامل ممکن است شکست بخورد. این قید، بسطی دقیق‌تر بر مبحث فشرده متن مبدأ

است.

مثال حل‌شده: تصویرگر یک بازنمایی تحویل‌ناپذیر را از کاراکتر بسازیم

برای گروه متناهی روی $\mathbb{C}$ ، اگر χ_α کاراکتر بازنمایی تحویل‌ناپذیر d_α بُعدی باشد، عنصر مرکزی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$p_\alpha = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\alpha(g^{-1}) g.$$

گام ۱. چون $\chi_\alpha(hgh^{-1}) = \chi_\alpha(g)$ مزدوج کردن با هر h این مجموع را عوض نمی‌کند؛ بنابراین p_α مرکزی است.

گام ۲. تصویر آن در بازنمایی تحویل‌ناپذیر β چنین است:

$$D^{(\beta)}(p_\alpha) = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_g \chi_\alpha(g)^* D^{(\beta)}(g).$$

این ماتریس با همه $D^{(\beta)}(h)$ ها جابه‌جا می‌شود، پس با لم شور cI است. با گرفتن رد و تعامد کاراکترها:

$$c d_\beta = d_\alpha \delta_{\alpha\beta}.$$

از آنجاکه وقتی $\alpha = \beta$ ابعاد برابرند، $c = \delta_{\alpha\beta}$. بنابراین p_α روی گونه α مانند همانی و روی همه گونه‌های دیگر مانند صفر عمل می‌کند.

گام ۳. از کامل بودن بازنمایی منتظم نتیجه می‌شود

$$p_\alpha p_\beta = \delta_{\alpha\beta} p_\alpha, \quad \sum_\alpha p_\alpha = e_G.$$

پس این فرمول، تصویرگرهای مرکزی متعامد را مستقیماً از کاراکترها به دست می‌دهد. توجه کنید p_α برای $d_\alpha > 1$ معمولاً مرکزی اولیه است، نه الزاماً خودتوان اولیه نامرکزی.

مثال حل‌شده: چرا مشخصه میدان مهم است؟

گروه $\mathbb{Z}_2 = \{e, s\}$ را این بار روی میدان $\mathbb{F}_2$ با دو عنصر ۰، ۱ در نظر بگیرید. چون $1 = -1$ در این میدان، پروژکتورهای $(e \pm s)/2$ اصلاً تعریف نمی‌شوند؛ تقسیم بر ۲ ممکن نیست. در بازنمایی دوبعدی $D(s) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ داریم

$$D(s)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \quad \text{در مشخصه ۲.}$$

خط $\langle e_1 \rangle$ ناورد است، ولی دقیقاً مانند مثال بازنمایی انتقال، هیچ مکمل ناوردایی ندارد. پس قضیه تجزیه کامل در این میدان شکست می‌خورد. این مثال، دلیل ریاضی قید $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ را ملموس می‌کند.

مسائل پایان فصل کتاب و حل تشریحی آنها

در کتاب اصلی پنج مسئله با شماره‌های P1.1–P1.5 آمده است. در این نسخه، صورت فارسی همه آنها همراه با راه حل مرحله به مرحله آمده تا خواننده ابزارهای پیشین را در عمل به کار گیرد.

مثال حل شده: P1.1 - از همانی چپ و وارون چپ تا گروه کامل

صورت مسئله. فرض کنید عمل دوتایی شرکت پذیر است، $ea = a$ ، و برای هر a عضوی b وجود دارد که $ba = e$. ثابت کنید $ae = a$ و $ab = e$.

گام ۱. برای b نیز وارون چپی مانند c وجود دارد که $cb = e$.
گام ۲. با شرکت پذیری:

$$a = ea = (cb)a = c(ba) = ce = c.$$

دقت کنید در این گام، هنوز $ce = c$ را نمی دانیم و نوشتن آن مجاز نیست! بنابراین این مسیر را اصلاح می کنیم: از $cb = e$ و $ba = e$ نتیجه می گیریم

$$a = ea = (cb)a = c(ba) = ce.$$

گام ۳. اکنون $ab = (ce)b = c(eb) = cb = e$ ، زیرا $eb = b$ ، پس همان b وارون راست نیز هست.
گام ۴. با استفاده از $ab = ba = e$ داریم $ae = a(ba) = (ab)a = ea = a$. بنابراین همانی و وارون ها دوطرفه اند. یکتایی همانی و وارون از قواعد استاندارد حذف به دست می آید.

مثال حل شده: P1.2 - چرا گروهی با مرتبه اول ساده است؟

صورت مسئله. ثابت کنید گروه متناهی G با $|G| = p$ (عدد اول) هیچ زیرگروه نابدیهی سره ای ندارد.

گام ۱. برای هر زیرگروه $H \leq G$ ، قضیه لاگرانژ می گوید $|H| \mid p$.
گام ۲. تنها مقسوم علیه های مثبت p ، اعداد ۱ و p هستند. اگر $|H| = 1$ ، آنگاه $H = \{e\}$ ؛ اگر $|H| = p$ ، آنگاه $H = G$.

نتیجه. زیرگروه سره نابدیهی وجود ندارد. افزون بر این، هر $a \neq e$ مرتبه p دارد و $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_p$. پس هر گروه با مرتبه اول، دوری و آبدلی است.

مثال حل شده: P1.3 - کوچک ترین خارج قسمتی آبدلی

صورت مسئله. اگر $H \trianglelefteq G$ و G/H آبدلی باشد، نشان دهید $G' \subseteq H$.
گام ۱. نگاشت خارج قسمتی $\pi : G \rightarrow G/H$ ، $\pi(g) = gH$ ، یک هم ریختی است.
گام ۲. برای هر $a, b \in G$:

$$\pi([a, b]) = \pi(a)\pi(b)\pi(a)^{-1}\pi(b)^{-1} = e_{G/H},$$

زیرا G/H آبدلی است.

گام ۳. پس هر جابه‌جاساز در $\ker \pi = H$ است؛ حاصل ضرب هر تعداد از آن‌ها نیز در H می‌ماند. بنابراین زیرگروهی که همه آن‌ها تولید می‌کنند، یعنی G' ، در H قرار دارد.

مثال حل‌شده: P1.4 - بازنمایی گروه انتقال در یک بُعد

صورت مسئله. برای تبدیل‌های $x \mapsto x + a$ ، ثابت کنید

$$a \mapsto D(a) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

یک بازنمایی است و نوع تحویل‌پذیری آن را مشخص کنید.
گام ۱. محاسبه ضرب:

$$D(a)D(b) = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D(a+b),$$

$$\text{و } D(a)^{-1} = D(-a), D(\cdot) = I$$

گام ۲. $\text{span}\{e_1\}$ ناورد است، پس بازنمایی تحویل‌پذیر است.

گام ۳. اگر خط مکمل ناوردایی با مولد $v = (x, y)^T$ وجود داشته باشد، باید $y \neq 0$ و $D(a)v = \lambda(a)v$ از مؤلفه دوم $\lambda(a) = 1$ و از اول $ay = 0$ برای تمام a نتیجه می‌شود؛ تناقض. نتیجه. این بازنمایی دو بُعدی، تحویل‌پذیر ولی تجزیه‌ناپذیر است؛ در نتیجه با هیچ ضرب داخلی مثبت معینی نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان برای تمام انتقال‌ها یکانی شود.

مثال حل‌شده: P1.5 - مدارها، پایدارسازها و لم شمارش مدارها

صورت مسئله. گروه متناهی G روی مجموعه متناهی X عمل می‌کند. ثابت کنید:

$$(A) \text{ اگر } y = g \cdot x \text{ آنگاه } H_y = gH_xg^{-1}.$$

(ب) مجموعه مدار $\mathcal{O}(x)$ با مجموعه هم‌دسته‌های G/H_x متناظر یک‌به‌یک است.

(ج) تعداد مدارها برابر $\sum_g |X^g|$ است.

حل (الف). $h \in H_y$ اگر و تنها اگر $h(gx) = gx$ یا معادل آن $(g^{-1}hg)x = x$. بنابراین $h \in gH_xg^{-1}$ و تساوی اثبات می‌شود.

حل (ب). نگاشت $\Phi: G/H_x \rightarrow \mathcal{O}(x)$ را با $\Phi(gH_x) = gx$ تعریف کنید. اگر $gH_x = g'H_x$ آنگاه $g^{-1}g' \in H_x$ و $g'x = gx$ پس نگاشت خوش‌تعریف است. همین استدلال در جهت عکس، تزریق بودن را نشان می‌دهد؛ پوشا بودن از تعریف مدار پیداست. لذا $|\mathcal{O}(x)| = |G/H_x|$.

حل (ج). مجموعه زوج‌های ثابت‌گذار را به دو روش می‌شماریم:

$$\mathcal{P} = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}.$$

اگر اول g را ثابت بگیریم، $|\mathcal{P}| = \sum_g |X^g|$. اگر اول x را ثابت بگیریم، $|\mathcal{P}| = \sum_x |H_x|$. این مجموع را مدار به مدار گروه‌بندی می‌کنیم؛ در یک مدار $\mathcal{O}$ ، اندازه پایدارسازها برابر و $|\mathcal{O}| |H_x|$

$|G|$ است. پس هر مدار دقیقاً $|G|$ به مجموع می‌افزاید. بنابراین

$$\sum_g |X^g| = (\# \text{ مدارها}) |G|, \quad \boxed{\# \text{ مدارها} = \frac{1}{|G|} \sum_g |X^g|}.$$

چالش‌های تکمیلی محاسباتی برای دانشجوی فیزیک

این مسائل افزوده آموزشی هستند و در متن مبدأ نیامده‌اند. هدف آن‌ها استفاده ترکیبی از چند ایده فصل است.

مثال حل‌شده: چالش ۱ - چهار مکان روی یک حلقه؛ موده‌های نرمال را پیدا کنید

چهار جرم برابر را در چهار رأس یک مربع و با شرایط مرزی دوره‌ای تصور کنید. عمل انتقال یک خانه‌ای را با $Te_j = e_{j+1 \pmod{4}}$ تعریف می‌کنیم. $T^4 = I$ ، پس T نماینده مولد $\mathbb{Z}_4$ است. گام ۱. بردار فوریه‌ای $(1, \omega^k, \omega^{2k}, \omega^{3k})^T$ ، $v^{(k)} = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \omega^{3k})^T$ را بسازید. $\omega = e^{2\pi i/4} = i$. گام ۲. از $(Tv)_j = v_{j-1}$ به دست می‌آید $Tv^{(k)} = \omega^{-k}v^{(k)}$. گام ۳. اگر ماتریس نیرو $K = \kappa(2I - T - T^{-1})$ باشد، همان بردارها موده‌های نرمال‌اند و

$$Kv^{(k)} = \kappa(2 - \omega^k - \omega^{-k})v^{(k)} = 4\kappa \sin^2\left(\frac{\pi k}{4}\right)v^{(k)}.$$

برای جرم m ، فرکانس‌ها $\Omega_k = 2\sqrt{\kappa/m} |\sin(\pi k/4)|$ هستند؛ دو مود $k = 1, 3$ هم‌فرکانس‌اند. این محاسبه نمونه‌ای ملموس از ارتباط گروه دوری و طیف نوسانگرهای شبکه‌ای است.

مثال حل‌شده: چالش ۲ - آزمون تحویل‌ناپذیری فقط با ردها

فرض کنید بازنمایی چهاربُعدی S_4 کاراکتر $\chi = (4, 0, 1)$ روی سه کلاسی e ، ترانهاده، دور سه‌تایی داشته باشد. آن را تجزیه کنید. گام ۱. با جدول کاراکترها:

$$m_1 = \frac{4 + 0 + 2}{6} = 1, \quad m_{\text{sgn}} = \frac{4 + 0 + 2}{6} = 1,$$

$$m_2 = \frac{8 + 0 - 2}{6} = 1.$$

گام ۲. جمع ابعاد $4 = 1 + 1 + 2$ است، پس هیچ جزء گم نشده است. نتیجه. $D \cong 1 \oplus \text{sgn} \oplus 2$. همچنین $\|\chi\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3 > 1$ پس تحویل‌پذیر است. جالب اینکه همین کاراکتر، در مسئله $2 \otimes 2$ به دست آمد.

مثال حل‌شده: چالش ۳ - شمارش گردنبد با چهار مهره دورنگ

چهار مهره سیاه و سفید روی یک حلقه قرار گرفته‌اند و فقط دوران‌ها، نه بازتاب‌ها، معادل شمرده می‌شوند. گروه $C_4 = \{e, r, r^2, r^3\}$ عمل می‌کند.
 گام ۱. همانی $16 = 4^2$ حالت را ثابت می‌گذارد.
 گام ۲. دوران یک‌خانه‌ای یا سه‌خانه‌ای، تنها دو حالت یک‌رنگ را ثابت می‌گذارد: هر کدام ۲ حالت.
 گام ۳. دوران دو‌خانه‌ای دو چرخه مستقل $(1\ 3)$ و $(2\ 4)$ دارد؛ هر چرخه می‌تواند مستقل از دیگری یک رنگ بگیرد، پس $4 = 2^2$ حالت ثابت دارد.
 گام ۴. لم کوشی - فروبنیوس می‌دهد

$$N = \frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

اگر بازتاب‌ها را نیز مجاز کنیم، باید گروه بزرگ‌تر D_4 را به کار ببریم و پاسخ عوض می‌شود؛ تعریف دقیق «چه چیزی را یکی می‌شماریم» بخشی از فیزیک مسئله است.

مثال حل‌شده: چالش ۴ - پروژکتورهای مرکزی S_3 از کجا می‌آیند؟

سه کلاس S_3 را داریم. با فرمول بخش جبر گروه، برای بازنمایی بدیهی و علامت:

$$p_1 = \frac{1}{6} \sum_{g \in S_3} g, \quad p_{\text{sgn}} = \frac{1}{6} \sum_{g \in S_3} \text{sgn}(g)g.$$

برای بازنمایی دو بُعدی استاندارد، چون $d_2 = 2$ و کاراکتر روی کلاس‌ها $(2, 0, -1)$ است:

$$p_2 = \frac{2}{6} (2e - (1\ 2\ 3) - (1\ 3\ 2)) = \frac{1}{3} (2e - (1\ 2\ 3) - (1\ 3\ 2)).$$

واریسی. اگر سه فرمول را جمع کنیم، ضریب e برابر $1 = 1/6 + 1/6 + 2/3$ است؛ ضریب هر ترانهاده $0 = 1/6 - 1/6 + 0$ ، و ضریب هر دور سه‌تایی $0 = 1/6 + 1/6 - 1/3$ می‌شود. بنابراین

$$p_1 + p_{\text{sgn}} + p_2 = e.$$

این سه عنصر، سه گونه بازنمایی را در جبر گروه از یکدیگر جدا می‌کنند، بدون آنکه پایه ماتریسی دلخواهی انتخاب کنیم.

مثال حل‌شده: چالش ۵ - شکافتن سطح انرژی با تقارن

فرض کنید یک سامانه کوانتومی دارای تقارن S_3 است و فضای حالت مورد بررسی، بازنمایی جایگشتی سه بُعدی آن را حمل می‌کند. اگر هامیلتونی H با همه ماتریس‌های جایگشتی جابه‌جا شود، شکل آن چیست؟

گام ۱. جابه‌جایی با همه جایگشت‌ها، تمام درایه‌های قطری H را برابر a و همه درایه‌های خارج قطر را برابر b می‌کند:

$$H = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} = (a-b)I_3 + bJ_3.$$

گام ۲. روی بردار متقارن $(1, 1, 1)^T$ ، ماتریس J_3 مقدار ویژه ۳ دارد؛ پس انرژی $E_1 = a + 2b$ است. گام ۳. روی صفحه $x + y + z = 0$ داریم $J_3 v = 0$ ؛ بنابراین انرژی دوبار تکرارشونده $E_2 = a - b$ است.

نتیجه. به جای حل معادله مشخصه درجه سه، تقارن به‌تنهایی ساختار $1 \oplus 2$ و تبهگنی دوتایی را تعیین کرده است.

واژه‌نامه بسیار کوتاه

اصطلاح فارسی	برابر انگلیسی
گروه، زیرگروه، زیرگروه نرمال	group, subgroup, normal subgroup
هم‌دسته، کلاس مزدوج	coset, conjugacy class
عمل گروهی، مدار، پایدارساز	group action, orbit, stabilizer
همریختی، یکرختی، خودریختی	homomorphism, isomorphism, automorphism
بازنمایی، وفادار، یکانی	representation, faithful, unitary
تحویل ناپذیر، تجزیه‌پذیر	irreducible, decomposable
کاراکتر، میان‌باف، ضرب تانسوری	character, intertwiner, tensor product
جبر گروه، مدول، خودتوان	group algebra, module, idempotent

منابع و یادداشت درباره متن

منبع اصلی ترجمه: فصل اول، Basic Group Theory and Representation Theory از کتاب Con-
tinuous Groups for Physicists، بر اساس فایل ۲۶ صفحه‌ای بارگذاری شده. ترتیب پانزده بخش،
اصطلاحات محوری، قضیه‌ها و پنج مسئله پایانی از متن اصلی گرفته شده‌اند. توضیح‌های میان‌راهی،
کادرهای حل مسئله، چالش‌های فیزیکی و تاریخچه‌ها افزوده آموزشی‌اند. در چند مورد، برای دقت علمی،

یادداشت ویرایشی نیز آمده است.

منابع کلاسیک معرفی شده در پایان فصل اصلی: Boerner (1963); Hamermesh (1962); Jansen & Boon (1967); Weyl (1931); Wigner (1959).

مآخذ بررسی تاریخی و نکات تکمیلی:

- MacTutor، تاریخچه نظریه گروه‌ها و زندگی‌نامه‌های فروبنیوس، شور و ماشکه؛ پیوند به منبع.
- Encyclopedia of Mathematics، مقاله لم برنساید؛ پیوند به مقاله.
- مقاله مروری Angular Momentum Diagrams درباره ریشه‌های جبری روش کلبش - گوردان.
- برای توضیح قضیه ماشکه و جبر گروه بر میدان عمومی: متون استاندارد نظریه بازنمایی گروه‌های متناهی؛ این نکته فراتر از اختصار متن فصل اصلی است.